


hac etiam plures uenarum soboles in uniuersos propemodum femoris os ambientes musculos propagantur: inter ceteras autē præcipua finem eius^a uenæ, quam per pubis ossis foramen in femur delabi dictum est, ad se^b assumit, eoq; adaucta, deorsum magis ad genu usque quodam modo inter musculos occultata descendit. Ceterum maxima uena sensim ad femoris os uersus posteriora contorta, ramulos oppidò quàm exiles^c grandioribus femur petentibus neruis offert, qui in membranas neruis obductas digeruntur. Dein^d aliam emittit propaginem, quæ in posteriorem femoris cutem excurrens, furculos etiam sursum cutem subeuntes deriuat. Huic propagini frequenter à^e ramo quem in maximum corporis musculum dispensari diximus, soboles quædam accedit, quæ unà cum ipsa commiscetur, & uena ex duabus confluens, sicut relatum est, cutem adit. Crebrius tamen^f duæ à grandi uena enascuntur propagines, una humilior altera. Hæ in progressu inuicem unice eam constituunt uenam, quæ hic in cutem promittitur, ac ubi^g ramulos sursum in posteriorem femoris cutem germinauit, recto tramite deorsum per mediam flexus genu sedem seu poplitem ad suræ cutem descendit, ipsi^h numerosam ramulorum seriem porrigens, quæ sibi in omnibus minime correspondet. Verum ramulorum alij recta, alij oblique, alij transuersim in cutem excurrunt, & denuò nonnulli inuicē coeuntes permiscuntur ac uniuntur, & denique cumⁱ uenæ ramulis subinde coeunt, quam per cruris interiora decliuem sub cute ferri diximus. Arque, ut semel dicam, huiusmodi hæc uenarum implexus digestioq; conspicitur, ut cutem suræ uaricum affectu crebrius (perinde ac temporum & internæ cubiti sedis cutem) implicari non mirum sit. Præsens uena per genu flexus cutem in suram descendens, aliquando ad calcem usque proropens inibi^j cessat, aliquando alijs ramulis per tibiam exteriora huc pertinentibus commiscetur, & secundum^k exteriorē malleolū porrecta, pedis superiora adit, nonnunquā uerò & inferiora, nullibi interim in altum à cute demersa. Ceterum grandis uena femoris ossi quemadmodum scripsimus accumbens, adeò ipsi aduoluitur, ut iuxta genu articulum^l mediam inter duo humiliora femoris capita sedem occupet. Hic in duos impares ramos deducta^m interiorem (quiⁿ exteriori multo gracilior est) ad suræ musculos, præcipue uerò ad pedem mouentiu^o primum & secundum, deorsum mittit, furculis quibuldam horum superficiem implicans, & subinde etiā furculos in progressu ad internæ tibie sedis cutem^p dispergens. Quum uerò interior hic ramus ad tibiam humiliorem usque appendicem^q perrepsit, atque in dictam nuper cutem furculos diffudit, sub interiori malleolo reflexus, internum pedis latus ad pollicem usque accedit, inibi in cutem ut plurimum absumptus. Rarius nanque inter calcem & tibiam os unā cum tendinibus hæc pedis inferiora subeuntibus, ramus ille ad pedis digitos proficiscitur. Exterior ramus magnæ illius in poplite latitantis partitionis non procul ab exortu in binas rursus diducitur propagines, quarum^r maior cademq; interior penitus inter^s musculos posteriorem tibie sedem occupantes immergitur. Primum nanque inter capita primi secundiq; pedem mouentium musculorum recta descendit, ac dein inter quartum & quintum pedis motores, & deinde inter musculos digitorum flexus opifices hinc à tibia pronatos fertur, interdum etiam^t ligamentum cōtingens, quod fibulam tibie ossi secundum tibie longitudinem colligat. In hoc descensu interior hæc propago illis quos perreptat musculis ramulos offert, à quibus nulli, aut profectò longè paucissimi in cutem subeunt, iuxta medium ferè longitudinis tibie præsens interiorq; propago in duos^u partitur ramos, quorum interior tali cum tibia articulo^v ramulum offert, ac totus quodammodo unā cum tendinibus à posteriori tibie sede ad pedis inferiora reflexus inter calcem & tibie os pedis inferiora subit, & sub^w musculo secundos quatuor digitorum articulos flectente propagatus, duos furculos pollicis & item indicis, medio autē digito unicum præbet, itaq; absumitur. Quamquam frequentissimè hic^x interioris illius propaginis ramus (quemadmodum & neruus pedis inferiora subiens) in omnes digitos digeritur, nullo ramo inter fibulam & calcem huc pedem^y accedente. Verum alter ramus qui eius diuisionis exterior est, quam paulo antè ad medium longitudinis tibie fieri dicebā, fibulæ exporrigitur: & quum ad infimam tibie sedem pertingit, atque ligamento membraneo, quod tota tibie longitudine fibulam tibie ossi committit, proximè est, sobolem à se dispergit, quæ ligamentum perforans, unā cum tendinibus per tibie anteriora pedis superiora adeuntibus in pedem fertur, ac^z musculis pedis digitos in exteriora abducentibus furculos offert, quibusdam etiam ramulis in cutem sparsos. Quod autem alterius rami illius reliquum est, cum septimi & octauī pedem mouentium^{aa} musculorum tendinibus in pedis humiliora proficiscitur, atque in minimos digitos dispēsat: nisi forte interior ramus inter tibie os calcemq; pedis inferiora petens, omnibus digitis furculos exhibeat. Varia enim hic (si alicubi profectò) uenarum series occurrit. nam crebrò (quod etiam diligenter in sanguinis è uulnribus fluxu obseruandū est) conspicies^{ab} interiorem illam propaginem, quam in po

in posteriori tibie sede inter musculos altè recondi dicebam, ilico atq; posteriori contingit, sobolem inter tibie os & fibulam per membraneum ligamentum secundum tibie longitudinem anteriori eius ligamenti regioni attensa, ad pedem fertur. Verum tunc propago illa quæ in posteriori tibie sede deorsum properat, non amplius^c insigni diuisione dissecta, sed sola pedis inferiora, omnesq; digitorum rursus inter musculos, anteriorem tibie sedem occupantes^d alia sobole ea propagine quam nondum persecutus sum originem ducens. Reliqua enim prior propago, exterioris rami magnæ in poplite diuisionis, quæ ad superiores dicem fertur: & quum à^e propagine quam tibie posteriorem sedem occupare teriores tibie musculos nulla soboles per membraneum ligamentum ducitur, propagine ramus inter septimum & sextum pedem mouentium musculos pro sobole digestus, in musculos anteriorem tibie ossis sedem occupantes. Aliā prior propago in exterioris tibie sedis cutem potissimum frequentibus furculis præcipuo ipsius furculo nunc antrosum, nunc retrorsum ad interiorem malleoli pedis superiora accedit, & potissimum externum pedis latus perreptat, alijsq; bus uenis commiscetur, nusquam in altum mergens. Quum itaq; differens uenarum tibie & pedis cutem implicantium sit series, sua seriem eam non secus quā dum præcepi, in uariarum hominum cruribus uinculo interceptis, aut calenti contemplari, modò eam sobolem in superficie excurrentem, uenarum secandā pendendam duxeris. Ego enim parum superficialias pedis uenas morari soleo: nu ipse eas exercitij nomine non semel aperuerim: quodq; omnes pedis uenæ eo, qui scilicet per inguinis crus subit, principium ducant. & arbitror Græcos uenarum quā^m quæ internum genu regionem perreptat, & in obesis mulierculis uel uenarum ris ligationem later, & deinⁿ quæ malleolos ambiunt. Adeò ut etiam nostræ arteriæ, qui cum alicubi legerint quatuor uenas ad pedis superiora pertingere (uti cutem enarraui) quatuor pedis adscribunt uenas, quas magno supercilio in sanis distinguūt, interim ignorantes ipsarum progressum & exortum, ac longè grauius pedis superiori sede cum neruorum, tum tendinum occasione, uenas secari, quæ genu, atque ad malleolos cōstitit. ut modò elegantem promptumq; sanguinis præteream. Venarum autem quas illi statuunt, primā Saphenam, & matricis uenalem nuncupant, atq; illam ad internum malleolum reponunt. Secundam externam ascribunt, illam Schiaticam nuncupantes. Quæ pollicis exporrigitur, illis hominibus dicitur, hancq; tertiam numerant. Quartam renalem constituūt, eam iuxta malleolos diuidentes. Quod uerò ad totius uenæ causæ administrationem spectat, sedulò libris persequar, ubi earum partium quas interreptant sectionem edocebo. Fide quinti & sexti & septimi librorū accuratissimè. Nam & in septimo communis arteriarum & neruorum in manus accurra pertinentiu sectionis rationem in

DE VMBILICI VENÆ. Caput XI.



NVD A umbilici uenæ delineatio, eius nimirum partis quæ in natis ob A uenæ sedem notat quæ umbilicum spectat, B uerò sedem qua hæc iecori inferuntur uerò ipsius in iecoris substantia seriem ruditer exprimit. Vnde etiam quinti libris maxime spectantes ueniunt examinandæ, trigesima uidelicet, quæ quatuor tabularum cum ipso factu proponit. Dein secunda eius libri figura, quæ umbilici portis serie relictam ostendit: ac in super umbilici uenæ, & arteriarum, & urinarum foras urinæ peculiariter educit. Præter alias eiusdem libri figuras, quæ umbilici sectionem oculis subiiciunt, nimirum duodecima, & uigesima.